



www.regionalgeologie-ost.de

Computergrafik: D. FRANKE

Abb. 34 Regionaleinheiten des Thüringisch-Vogtländischen Schiefergebirges und angrenzender Gebiete

(nach P. PUFF 1994; D. LEONHARDT 1995; G. SEIDEL et al. 2002)

1 - Südostflanke der Oberhofer Mulde; 2 - Ehrenberg-Scholle; 3 - Schleuse-Horst; 4 - Masserberger Scholle; 5 - Crocker Scholle; 6 - Stockheimer Becken; 7 - Gräfenthaler Horst; 8 - Lobensteiner Horst; 9 - Blintendorfer Synklinale; 10 - Hirschberg-Gefeller Antiklinale; 11 - Schleiz-Mühltruffer Querzone; 12 - Pörmitzer Faltenzone; 13 - Greizer Querzone; 14 - Ronneburger Querzone; 15 - Westabschnitt der Vorerzgebirgs-Senke; 16 - Netzschkauer Querzone; 17 - Tauschwitzer Querzone; 18 - Südvogtländische Falten- und Schuppenzone ("Plauener Bögen"); 19 - Triebeler Querzone; 20 - Kirchberger Granit; 21 - Bergener Granit; 22 - Westabschnitt des Eibenstocker Grabits; 23 - Fichtelgebirgs-Granit