



www.regionalgeologie-ost.de

Computergrafik: D. FRANKE

Abb. 36.6 Regionale Verbreitung variszischer Zinn-Wolfram-Vorkommen im Erzgebirge (Auswahl)

(nach L. BAUMANN et al. 2000)

Als geologische Grundlage wurde eine Darstellung gewählt, wie sie für das Verständnis der Literatur bis in den Zeitraum 1995/2000 erforderlich ist. Aktuellere Versionen vgl. Abb. 36.9 (Kartierungseinheiten) und Abb. 36.10 (Deckeneinheiten)

- 1 - Krupka; 2 - Cinovec; 3 - Zinnwald; 4 - Löwenhain; 5 - Altenberg; 6 - Schellerhau; 7 - Sadisdorf; 8 - Nieder-Bobritzsch; 9 - Freiberg; 10 - Halsbrücke; 11 - Hora Svate Kateriny; 12 - Seiffen; 13 - Pobershau; 14 - Marienberg; 15 - Ehrenfriedersdorf; 16 - Geyer; 16a - Annaberg; 17 - Zschorlau/Griesbach; 18 - Aue-Bärengrund; 19 - Pöhl; 20 - Niederschlag-Bärenstein; 21 - Jáchymov; 22 - Johanngeorgenstadt; 23 - Eibenstock; 24 - Weißbach; 25 - Pechtelsgrün-Stangengrün; 26 - Gottesberg; 27 - Mühlleiten; 28 - Klingenthal