

Lithostratigraphisches Modell


W. LORENZ & K. HOTH 1990;
D. LEONHARDT et al. 1997

Phycoden-Gruppe	
Frauenbach-Gruppe	
~ 500 Ma	
Thum-Gruppe	Halbmeile-Formation
	Herold-Formation
Joachimsthal-Gruppe	Breitenbrunn-Formation
	Grießbach-Formation
Keilberg-Gruppe	Fichtelberg-Formation
	Obermittweida-Formation
	Raschau-Formation
~ 570 Ma	
Niederschlag-Gruppe	Kunnerstein-Fm.
	Kovarska-Fm.
~ 680 Ma	
Preßnitz-Gruppe	Medenec-Formation
	Rusova-Formation
~ 1000 Ma	
Osterzgebirge-Gruppe	Annaberg-Wegefarth-Formation
	Brand-Formation
	Freiberg-Formation

www.regionalgeologie-ost.de


Tektonostratigraphisches Modell

K. RÖTZLER 1995; U. SEBASTIAN 1995;
B. MINGRAM & K. RÖTZLER 1999



Aktualisiertes Modell

H.-J. BERGER, O. KRENTZ,
M. LAPP (2008)



Computergrafik: D. FRANKE

Abb. 36.8 Gegenüberstellung des Modells lithostratigraphischer Kartierungseinheiten und der Modelle tektonostratigraphischer Deckeneinheiten im Bereich des Erzgebirgs-Antiklinoriums

(nach H.-J. BERGER, O. KRENTZ & M. LAPP 2008)